

乐松[®]贴剂简要处方信息

【通用名】洛索洛芬钠贴剂

【性状】本品为淡褐色至褐色膏体，涂布于背衬层上，膏体表面覆盖透明保护层。

【适应症】用于骨关节炎、肌肉痛、外伤导致的肿胀或疼痛。

【规格】每贴 7cm×10cm，含洛索洛芬钠 50mg。

【用法用量】1 日 1 次，贴于患处。

【不良反应】主要有瘙痒、红斑、接触性皮炎等皮肤症状，胃部不适等消化道症状以及 ALT、AST 等实验室检查值异常等。

【禁忌】对本品任何成分有既往过敏史者；患有阿司匹林诱发性哮喘或有既往史者。

【注意事项】支气管哮喘患者慎用。本品为对症治疗。不得用于损伤或不完整的皮肤及粘膜表面、有湿疹或皮疹的部位等。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚未确立安全性，建议权衡利弊。

【儿童用药】尚未确立安全性。

【老年用药】注意贴敷部位的皮肤情况。

【药物相互作用】暂无。

【贮藏】遮光，密封，不超过 25℃ 保存。

【包装】铝塑复合袋包装。3 贴/袋。

【有效期】36 个月。

【批准文号】进口药品注册证号：H20140638（50mg/贴）

分包装药品批准文号：国药准字 J20150124（50mg/贴）

【国内联系单位】第一三共（中国）投资有限公司

地址：上海市南京西路 1717 号会德丰国际广场 51 楼

邮政编码：200040

咨询电话：400-656-3228

传真号码：021-60397399

不良反应报告热线：021-60397322

注意：在处方前，请仔细阅读参阅中国批准的完整说明书。详细处方资料备索。

本资料非广告，仅供医学专业人士参考，不得向非医学人士发放。