

傲坦[®]简要处方信息

【通用名】 奥美沙坦酯片

【性状】 本品为白色薄膜衣片，除去包衣后显白色。

【适应症】 本品适用于高血压的治疗。

【规格】 (1) 20mg (2) 40mg

【用法用量】

剂量应个体化。在血容量正常的患者中，作为单一治疗的药物，通常推荐起始剂量为 20mg，每日一次。对经 2 周治疗后仍需进一步降低血压的患者，剂量可增至 40mg。

无论进食与否本品都可以服用。本品可以与其他利尿剂合用，也可以与其他抗高血压药物联合使用。

【不良反应】 本品有很好的耐受性，不良事件发生率与安慰剂组相似。在安慰剂对照临床试验中，唯一的一项发生率大于 1%且高于安慰剂治疗组的不良事件是头晕（3% vs 1%）。

【禁忌】 对本品所含成份过敏者禁用。不可将本品与阿利吉仑联合用于糖尿病患者。

【注意事项】 与肾功能正常患者相比，肾功能不全患者奥美沙坦血浓度升高。多次给药后，严重肾功能损害（肌酐清除率 < 20ml/分钟）患者的 AUC 大约为正常值的 3 倍。中度至显著肾功能不全患者（肌酐清除率 < 40ml/分钟）无需调整起始剂量。肾动脉狭窄患者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 在妊娠的中、晚期，使用直接作用于肾素-血管紧张素系统的药物可降低胎儿肾功能，增加胎儿和新生儿的发病率和死亡率。一旦发现妊娠应尽快停止使用本品。

【儿童用药】 本品不能用于 1 岁以下儿童高血压的治疗。

【老年用药】 老年患者服用本品不需调整剂量。

【药物相互作用】 不通过肝脏细胞色素 P450 系统代谢，对 P450 酶没有影响。因此，不会出现与这些酶抑制、诱导或者代谢相关的药物相互作用。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】 铝塑包装，7 片/盒。

【有效期】 36 个月。

【批准文号】

奥美沙坦酯片 20mg: 国药准字 H20060371

奥美沙坦酯片 40mg: 国药准字 H20060372

【生产企业】 第一三共制药（上海）有限公司

不良反应报告热线：021-60397322

注意：处方前，请仔细阅读中国批准的完整说明书。详细处方资料备案。

本资料非广告，仅供医学药学专业人士参考，不得向非医学人士发放