

## 复傲坦®简要处方信息

**【通用名】** 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片

**【性状】** 本品为薄膜衣片，除去包衣后显白色。

**【适应症】** 本品为固定剂量复方制剂，适用于高血压的治疗。

**【规格】** 每片含奥美沙坦酯 20mg 与氢氯噻嗪 12.5mg。

**【用法用量】** 本品口服，每日 1 次，每次 1 片。本品剂量应个体化。基于降压效果，剂量可以 2~4 周的间隔期作调整。在剂量范围 10mg/12.5mg 至 40mg/25mg 之间，本品抗高血压的效果与给药剂量呈相关性。奥美沙坦酯氢氯噻嗪片降压作用在一周内起效，四周时达最大降压效果。本品可以与其他抗高血压药物联合使用。如果患者肌酐清除率>30 mL/min，可采用本品常规剂量治疗。肝功能损害的患者，无需调整起始剂量。

**【不良反应】** 本品有良好的耐受性，不良事件的发生率和安慰剂相似。在安慰剂对照临床试验中，无论是否与药物治疗相关，发生率大于 2%且高于安慰剂组的不良事件包括：恶心、高尿酸血症、头晕和上呼吸道感染。

**【禁忌】** 对本品所含成份过敏者禁用。由于含有氢氯噻嗪成分，无尿患者或对其其它磺胺类药物过敏者禁用。

**【注意事项】** 肾动脉狭窄患者慎用。严重的肾病患者应谨慎使用噻嗪类药物。所有接受噻嗪类药物治疗的患者，应以适当的周期定期测定血清电解质，以发现可能发生的电解质失衡。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】** 在妊娠中、晚期，使用直接作用于肾素-血管紧张素系统的药物可降低胎儿肾功能，增加胎儿和新生儿的发病率和死亡率。一旦发现妊娠应尽快停止使用本品。

**【儿童用药】** 尚未建立儿童用药的安全性和有效性数据。

**【老年用药】** 老年患者的剂量选择应谨慎，一般以低剂量开始。

**【药物相互作用】** 奥美沙坦酯不通过肝脏细胞色素 P450 系统代谢，对 P450 酶没有影响。因此，不会出现与这些酶抑制、诱导或者代谢相关的药物相互作用。同时服用以下药物可能会与噻嗪类利尿剂产生相互作用：酒精、巴比妥类或麻醉药、降糖药物、消胆胺、肾上腺素、锂、非甾体抗炎药等。

**【贮藏】** 遮光，密封保存。

**【包装】** 铝塑包装，7 片/盒。

**【有效期】** 36 个月。

**【批准文号】** 国药准字 H20100035

**【生产企业】** 第一三共制药（上海）有限公司

不良反应报告热线：021-60397322

注意：处方前，请仔细阅读中国批准的完整说明书。详细处方资料备索。

本资料非广告，仅供医学药学专业人士参考，不得向非医学人士发放。