

泰利必妥®简要处方信息

【通用名】氧氟沙星片

【商品名】泰利必妥®

【规格】0.1g。

【性状】白色薄膜衣片，除去薄膜衣后显类白色至微黄色。

【适应症】敏感菌所引起的皮肤及软组织感染、浅表性继发感染、呼吸系统感染、尿路感染、妇科及眼耳鼻喉口感染等。

【用法用量】口服，成人每日 0.3-0.6g，分 2-3 次服用。根据感染的种类及症状，可适当增减。

【药理作用】作用于细菌细胞的 DNA 旋转酶的 A 亚单位，阻碍 DNA 的合成和复制。

【药物相互作用】与苯醋酸类或丙酸类非甾体抗炎镇痛药合用可能引起痉挛；与含有铝、镁的抗酸药和含铁剂合用降低疗效；与香豆素类抗凝剂合用可抑制其肝代谢。

【禁忌】对喹诺酮类抗菌药有过敏史者、孕妇及哺乳期妇女、儿童禁用。

【注意事项】重度肾功能减退、罹患或曾患过癫痫的患者要慎重给药。

【不良反应】可能出现的严重不良反应：休克、过敏症；中毒性表皮坏死松解症、皮肤黏膜眼综合症；抽搐；急性肾功能不全；黄疸；粒细胞缺乏症；白细胞减少症；溶血性贫血；间质性肺炎；重症结肠炎；横纹肌溶解症；低血糖；跟腱炎、跟腱断裂等；精神紊乱症；过敏性血管炎；抑郁症。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】铝塑包装，每板 10 片，每盒 1 板、2 板或 3 板

【有效期】24 个月

【批准文号】国药准字 H20023106

【生产企业】第一三共制药（北京）有限公司

不良反应报告热线：400-656-3228

注意：处方前，请仔细阅读中国批准的完整说明书。详细处方资料备索。
本资料非广告，仅供医学、药学专业人士参考，请勿向非医学人士发放。